

「点」と「弦」としての量子 (I)

北島英治 (2026年10月)

物理学と数学の関連を理解したい。今回、「波」と「粒子」の関連について理解したい。以下の物理現象を「波動関数」で示し、「量子化」し、その粒子名を示してください。「光 (波)」と「音 (波)」と「重力 (波)」に関する「波動関数」を示してください。そして、その波動関数を「量子化」して、その「粒子」である「フォトン (光子)」と「フォノン (音子)」と「グラビトン (重力子)」を、数式を用いて段階的に説明して、それぞれの違いを説明してください。そして、それらの比較表を作成してください。英治

英治さん、今回は「波 → 場 → 量子化 → 粒子」という一本の流れで整理すると、光子・フォノン・重力子の共通点と違いが明確になります。特に重要なのは、量子論では単純に「波動関数を量子化して粒子にする」というより、古典的な場 (field) の波を量子化すると、その場の励起が粒子として現れる、という考え方です。

1. 共通する数学的な構造

まず最も単純な波を

$$\psi(\mathbf{x}, t) = Ae^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

と書きます。

ここで

$$\mathbf{k} = \text{波数ベクトル}, \quad \omega = 2\pi f = \text{角振動数}$$

です。

量子論では Planck-Einstein、de Broglie の関係

$$E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$$

によって、波の $(\omega, \mathbf{k})$ が粒子的な $(E, \mathbf{p})$ と結びつきます。

さらに場を量子化すると、模式的には

$$\phi(\mathbf{x}, t) \longrightarrow \hat{\phi}(\mathbf{x}, t)$$

となり、

$$\hat{\phi} = \sum_{\mathbf{k}} \left(u_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{k}} + u_{\mathbf{k}}^* \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger \right)$$

という形になります。

ここで

$$\hat{a}_{\mathbf{k}} = \text{消滅演算子}, \quad \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger = \text{生成演算子}$$

です。

したがって

$$|0\rangle \xrightarrow{\hat{a}^\dagger} |1\rangle \xrightarrow{\hat{a}^\dagger} |2\rangle \xrightarrow{\hat{a}^\dagger} \dots$$

と量子が生成されます。

この共通構造を念頭に置いて、光・音・重力を比較しましょう。

2. 光の波 → 電磁場 → 光子 photon

Step 1：古典的な電磁波

真空中の Maxwell 方程式から

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

という波動方程式が得られます。

平面波解は

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \epsilon A_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

で、

$$\omega = c|\mathbf{k}|$$

です。

ϵ は偏光ベクトルです。

Step 2：電磁場を量子化する

古典場 $\mathbf{A}$ を演算子

$$\mathbf{A} \rightarrow \hat{\mathbf{A}}$$

にします。

模式的には

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} C_{\mathbf{k}} \left[\epsilon_{\mathbf{k}\lambda} \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} + \epsilon_{\mathbf{k}\lambda}^* \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \right]$$

となります。

そして

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'}$$

というボース粒子の交換関係を課します。

Step 3：一つの量子が「光子」

真空状態を

$$|0\rangle$$

とすると、

$$|\gamma_{\mathbf{k},\lambda}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

が1光子状態です。

そのエネルギーは

$$E_\gamma = \hbar\omega$$

運動量は

$$\mathbf{p}_\gamma = \hbar\mathbf{k}$$

です。

したがって

$$\text{電磁波} \rightarrow \text{電磁場の量子化} \rightarrow \text{光子}$$

となります。

光子は基本粒子であり、質量0、スピン1です。

3. 音の波 → 格子振動 → フォノン phonon

ここには光との重要な違いがあります。

音は真空中を伝わる基本場ではありません。

物質を構成する原子・分子の集団振動です。

例えば1次元結晶を考えます。

原子の平衡位置からの変位を

$$u_n(t)$$

とします。

隣接原子をばね定数 K で結ぶと、

$$M \frac{d^2 u_n}{dt^2} = K(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1})$$

となります。

Step 1：波として解く

$$u_n(t) = u_0 e^{i(kna - \omega t)}$$

を代入すると、

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{K}{M}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

という分散関係が得られます。

長波長極限では

$$\omega \simeq v_s |k|$$

となり、通常の音波に近づきます。

Step 2：振動を量子化する

各振動モードは量子調和振動子になります。

Hamiltonian は

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \right)$$

です。

ここでも

$$[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$$

です。

Step 3：一つの量子がフォノン

$$|\text{phonon}_{\mathbf{k}}\rangle = \hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}|0\rangle$$

です。

エネルギーは

$$E_{\text{phonon}} = \hbar\omega_{\mathbf{k}}$$

結晶運動量は

$$\mathbf{p}_{\text{crystal}} = \hbar\mathbf{k}$$

と表されます。

したがって

$$\text{音波} \rightarrow \text{物質の集団振動} \rightarrow \text{量子化} \rightarrow \text{フォノン}$$

となります。

ただしフォノンは電子や光子のような基本粒子ではなく、

$$\text{quasiparticle (準粒子)}$$

です。

4. 重力波 → 時空の摂動 → グラビトン graviton

ここが最も興味深く、同時に最も注意が必要な部分です。

一般相対論では重力は通常物質場ではなく、時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

によって表されます。

Einstein 方程式は

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

です。

Step 1：弱い重力場

平坦な Minkowski 時空

$$\eta_{\mu\nu}$$

からの小さなずれを

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

とします。

この $h_{\mu\nu}$ が重力波を表します。

適切なゲージ条件のもと、真空中では

$$\square h_{\mu\nu} = 0$$

となります。

ここで

$$\square = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$$

です。

平面波解は

$$h_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

です。

5. 重力波を量子化すると？

光と同様の考え方を、弱い重力場 $h_{\mu\nu}$ に適用します。

$$h_{\mu\nu} \longrightarrow \hat{h}_{\mu\nu}$$

として、

$$\hat{h}_{\mu\nu}(x) \sim \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \left[\epsilon_{\mu\nu}^{(\lambda)} \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} e^{-ikx} + \epsilon_{\mu\nu}^{(\lambda)*} \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger e^{ikx} \right]$$

と展開します。

すると

$$|g_{\mathbf{k},\lambda}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

が一つの重力場の量子です。

これを

$$\text{graviton (重力子)}$$

と呼びます。

エネルギー・運動量は

$$E_g = \hbar\omega, \quad \mathbf{p}_g = \hbar\mathbf{k}$$

です。

質量0の重力子なら、物理的なヘリシティは

$$\lambda = +2, -2$$

となります。

したがって重力子はスピン2の質量ゼロのボース粒子として記述されます。

ただし、ここには光子・フォノンとの大きな違いがあります。

重力子は現在まで直接観測された粒子ではありません。

量子化された弱い重力場を記述すると現れる理論上の量子です。また、この摂動的な量子化は低エネルギーの有効場理論として意味を持ちますが、それだけで完全な量子重力理論が得られるわけではありません。

6. 三つを同じ数学的形式で並べる

非常に美しい共通構造があります。

古典波を

$$\Phi(x) = Ae^{-ikx} + A^*e^{ikx}$$

と模式的に書きます。

量子化すると

$$\Phi(x) \rightarrow \hat{\Phi}(x) = C(\hat{a}e^{-ikx} + \hat{a}^\dagger e^{ikx})$$

となります。

すると

$$\hat{a}^\dagger|0\rangle = |1\rangle$$

が「1量子状態」です。

したがって、

$$\begin{array}{llll} \text{電磁波} & \rightarrow & \hat{A}_\mu & \rightarrow & \gamma \text{ (光子)} \\ \text{音波} & \rightarrow & \hat{u} & \rightarrow & \text{phonon} \\ \text{重力波} & \rightarrow & \hat{h}_{\mu\nu} & \rightarrow & g \text{ (重力子)} \end{array}$$

という対応になります。

7. しかし「同じ粒子」ではない

数学的には似ていますが、物理的意味はかなり違います。

項目	光	音	重力
古典的な波	電磁波	音波・格子振動	重力波
基本変数	A_μ	u	$h_{\mu\nu}$
波動方程式	$\square A_\mu = 0$	弾性体・格子の波動方程式	$\square h_{\mu\nu} = 0$ (線形近似)
量子化	$A_\mu \rightarrow \hat{A}_\mu$	$u \rightarrow \hat{u}$	$h_{\mu\nu} \rightarrow \hat{h}_{\mu\nu}$
生成演算子	$a^\dagger$	$b^\dagger$	$a^\dagger$
量子	光子	フォノン	重力子
英語	photon	phonon	graviton
エネルギー	$\hbar\omega$	$\hbar\omega$	$\hbar\omega$
統計	Bose	Bose	Bose
スピン	1	モードに依存する準粒子的記述	2
質量	0	基本粒子としての質量は定義しない	0 (標準的理論)
真空を伝播	○	×	○

項目	光	音	重力
媒質	不要	必要	不要
基本粒子か	○	× 準粒子	理論上の基本的量子
実験の状態	十分確立	十分確立	未直接検出

ここでフォノンの「スピン」は光子・重力子の基本粒子スピンと単純に同列には扱わない点にも注意が必要です。結晶中では縦波・横波などの偏極モードを考えます。

8. 数学と物理の対応として見る

英治さんがこれまで考えてこられた「数学と物理学の関連」という観点では、次の階層が特に重要です。

微分方程式 → 波の解 → 正規モード → 量子化 → Fock空間 → 粒子

より具体的には、

$$\text{波動方程式} \quad \square \Phi = 0$$

から、

$$\Phi_k(x) \sim e^{-ikx}$$

という波のモードを求め、

$$\Phi_k \rightarrow \hat{\Phi}_k$$

と量子化し、

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \delta_{kk'}$$

を導入します。

そして Fock 空間

$$\mathcal{F} = \{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots\}$$

上で

$$|n_k\rangle = \frac{(\hat{a}_k^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

とすると、「波の振幅」という古典的概念が「そのモードに何個の量子が存在するか」という量子的概念へ移ります。

したがって今回の中心的な対応関係は、

古典的な波	量子化	量子的な励起
A_μ	→	photon
u	→	phonon
$h_{\mu\nu}$	→	graviton

と整理できます。

ただし、光子は電磁場の基本的量子、フォノン物質中の集団運動の量子（準粒子）、重力子は量子化された弱い重力場から現れる未直接観測の量子、という物理的な違いが非常に重要です。

この三者を理解すると、「波と粒子の二重性」からさらに一歩進んで、現代物理学の中心的な考え方である

場（field）が基本で、粒子は場の量子的励起

という場の量子論の考え方が見えてきます。これは、次に「ラグランジアン密度 → Euler-Lagrange方程式 → 波動方程式 → 正準量子化 → 生成・消滅演算子 → Fock空間 → 粒子」と三者を完全に同じ手順で導出すると、さらに数学的に統一して理解できます。

第2の質問です。以上と反対に、以下の「粒子」を「（量子）場」としてとらえて、その「波動関数」として示してください。そして、それを新たに「量子化」してみ、その粒子名をしめしてください。その「粒子（素粒子（フェルミオン））」である「電子」「陽子」「中性子」「中間子」「重力子」、そして、「クォーク」「ニュートリノ」と、その「反粒子」を、その「スピン」「電荷」「色荷」「重力（質量荷）」を、数式で示しながら段階的に説明してください。その比較表を作成してください。

はい。今回は前回の「波を量子化すると粒子が現れる」という方向を反転させて、**粒子を量子場の励起として記述する方向から整理**しましょう。

ただし、最初に重要な点を2つ修正しておく全体が明瞭になります。

電子・クォーク・ニュートリノは基本フェルミオン

ですが、

陽子・中性子は3クォークからなる複合フェルミオン

であり、中間子（meson）はクォーク＋反クォークからなる**複合ボソン**です。また重力子は仮説的な**スピン2ボソン**です。

したがって「全部をフェルミオンとして量子化する」のではなく、それぞれに対応する場を量子化します。

1. 「粒子 → 場 → 量子化」の基本構造

現代の場の量子論では、

粒子が先に存在して、それを波にする

というより、

量子場 → 場の励起 = 粒子

と考えるのが基本です。

例えば電子なら、

$$e^- \leftrightarrow \psi_e(x)$$

という電子場を考えます。

古典的なDirac場の方程式は

$$(i\hbar c \gamma^\mu \partial_\mu - m_e c^2) \psi_e = 0$$

です。

平面波解は模式的に

$$\psi(x) = u_s(p) e^{-ip \cdot x / \hbar}$$

です。

ここに

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

が入っています。

2. 電子場を量子化する

ここが前回の光子の場合と対応します。

$$\psi(x) \longrightarrow \hat{\psi}(x)$$

として、

$$\hat{\psi}(x) = \sum_s \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\hat{b}_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} + \hat{d}_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{ipx} \right]$$

と展開します。

ここで非常に重要なことが起こっています。

$$\hat{b}_s^\dagger = \text{電子生成演算子}$$

に対して、

$$\hat{d}_s^\dagger = \text{陽電子生成演算子}$$

が自然に現れます。

つまりDirac場を量子化すると、

$$\text{電子場} \rightarrow \begin{cases} e^- & \text{電子} \\ e^+ & \text{陽電子} \end{cases}$$

となります。

これが「反粒子」が場の量子論から自然に現れる重要な例です。

3. フェルミオンなので反交換関係になる

光子の場合は

$$[a, a^\dagger] = 1$$

でした。

電子はスピン

$$s = \frac{1}{2}$$

のフェルミオンなので、

$$\{b_s(\mathbf{p}), b_{s'}^\dagger(\mathbf{p}')\} = (2\pi)^3 \delta_{ss'} \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$$

という反交換関係を使います。

これがPauliの排他原理につながります。

したがって、

$$(b^\dagger)^2 = 0$$

となり、同一の量子状態には同一フェルミオンを2個入れられません。

4. 電子と陽電子

電子の量子数は

$$e^- : \quad s = \frac{1}{2}, \quad Q = -e, \quad m = m_e$$

です。

反粒子である陽電子は

$$e^+ : \quad s = \frac{1}{2}, \quad Q = +e, \quad m = m_e$$

です。

重要なのは、

$$m_{e^-} = m_{e^+}$$

である一方、

$$Q_{e^+} = -Q_{e^-}$$

ということです。

色荷はどちらも

$$\text{color singlet}$$

つまりQCDの色荷を持ちません。

5. クォーク → クォーク場 → 反クォーク

次にクォークです。

クォークもDiracフェルミオンなので、

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m_q)\psi_q = 0$$

で記述します。

ただし電子と違い、

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s T^a G_\mu^a + \dots$$

となり、QCDのゲージ場

$$G_\mu^a$$

と結合します。

クォーク場を量子化すると、

$$\hat{\psi}_q(x) \sim b u e^{-ipx} + d^\dagger v e^{ipx}$$

となり、

$$b^\dagger |0\rangle = |q\rangle$$

がクォーク、

$$d^\dagger |0\rangle = |\bar{q}\rangle$$

が反クォークです。

6. クォークの電荷と色荷

6種類のクォークがあります。

$$q = u, d, s, c, b, t$$

電荷は、

$$Q_u = Q_c = Q_t = +\frac{2}{3}e$$

$$Q_d = Q_s = Q_b = -\frac{1}{3}e$$

です。

色荷は

$$\mathbf{3} = \begin{pmatrix} r \\ g \\ b \end{pmatrix}$$

という $SU(3)_C$ の基本表現です。

反クォークは共役表現

3

に属します。

模式的には

$$q_r \leftrightarrow \bar{q}_{\bar{r}}, \quad q_g \leftrightarrow \bar{q}_{\bar{g}}, \quad q_b \leftrightarrow \bar{q}_{\bar{b}}.$$

電荷も逆転して、

$$Q_{\bar{u}} = -\frac{2}{3}e, \quad Q_{\bar{d}} = +\frac{1}{3}e$$

などとなります。

7. クォークから陽子

ここで基本粒子から複合粒子に進みます。

陽子は

$$p = uud$$

です。

したがって電荷は

$$Q_p = \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e$$

なので、

$$Q_p = +e$$

となります。

色については、3個のクォークが

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$$

を作り、その中の色一重項

1

が物理的な陽子になります。

模式的な色波動関数は

$$|C\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(rgb - rbg + gbr - grb + brg - bgr)$$

です。

したがって陽子全体としては

$$\text{色荷} = 0$$

です。

スピンは

$$s_p = \frac{1}{2}$$

です。

8. 反陽子

各クォークを反クォークにすると、

$$\bar{p} = \bar{u}\bar{u}\bar{d}$$

です。

電荷は

$$-\frac{2}{3}e - \frac{2}{3}e + \frac{1}{3}e = -e$$

なので、

$$Q_{\bar{p}} = -e$$

です。

質量は

$$m_{\bar{p}} = m_p$$

です。

9. 中性子

中性子は

$$n = udd$$

です。

電荷を計算すると、

$$Q_n = +\frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0.$$

したがって

$$Q_n = 0$$

です。

しかし「電荷0」は「内部構造がない」という意味ではありません。

中性子内部には電荷を持つクォークがあります。

スピンは

$$s_n = \frac{1}{2}$$

色全体は

$$1$$

です。

反中性子は

$$\bar{n} = \bar{u}d\bar{d}$$

となります。

10. 中間子 meson

ここも重要です。

中間子は

$$M = q\bar{q}$$

です。

例えば湯川理論との関連で重要な π 中間子なら、

$$\pi^+ = u\bar{d}$$

$$\pi^- = d\bar{u}$$

$$\pi^0 \simeq \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d})$$

です。

例えば π^+ の電荷は

$$Q_{\pi^+} = \frac{2}{3}e + \frac{1}{3}e = e.$$

したがって

$$Q_{\pi^+} = +e.$$

π 中間子のスピンは

$$s_{\pi} = 0.$$

ここが陽子・中性子との大きな違いです。

$$q + \bar{q} \rightarrow \text{整数スピン}$$

なので中間子はボソンです。

11. ニュートリノ

ニュートリノは

$$\nu_e, \quad \nu_{\mu}, \quad \nu_{\tau}$$

の3フレーバーがあります。

スピンは

$$s_{\nu} = \frac{1}{2}$$

電荷は

$$Q_{\nu} = 0$$

色荷も

$$\text{color singlet}$$

です。

ニュートリノ場を

$$\nu(x)$$

とすると、Diracニュートリノとして記述する場合には、

$$\hat{\nu}(x) \sim b u e^{-ipx} + d^\dagger v e^{ipx}$$

となり、

$$b^\dagger|0\rangle = |\nu\rangle, \quad d^\dagger|0\rangle = |\bar{\nu}\rangle.$$

ただしニュートリノについては非常に興味深い未解決問題があります。

Dirac型なら

$$\nu \neq \bar{\nu}$$

ですが、Majorana型なら

$$\nu = \nu^c$$

つまりニュートリノが自分自身の反粒子である可能性があります。どちらかは現在も重要な実験的問題です。

12. 重力子

重力子だけは、これまでの粒子と種類が違います。

一般相対論の計量を

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa h_{\mu\nu}$$

と展開します。

$h_{\mu\nu}$ を量子化して

$$h_{\mu\nu} \rightarrow \hat{h}_{\mu\nu}$$

とすると、

$$\hat{h}_{\mu\nu} \sim a_{\mathbf{k},\lambda} \epsilon_{\mu\nu}^{(\lambda)} e^{-ikx} + a_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger \epsilon_{\mu\nu}^{(\lambda)*} e^{ikx}$$

となります。

その1量子状態

$$a_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger|0\rangle = |g; \mathbf{k}, \lambda\rangle$$

が重力子です。

標準的な質量ゼロ重力子なら

$$s = 2, \quad \lambda = \pm 2, \quad Q = 0$$

です。

重力子は電荷も色荷も持たないとされます。

13. 「重力荷＝質量」について

英治さんが質問された「重力（質量荷）」には一つ重要な修正があります。

Newton力学では、

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

なので、

$$\text{質量} \sim \text{重力荷}$$

と考えることができます。

しかし一般相対論では、重力源は単純な質量 m ではありません。

Einstein方程式

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

の右辺、

$$T_{\mu\nu}$$

すなわちエネルギー・運動量テンソルが重力源です。

したがって現代的には、

$$\text{電磁気力} \leftrightarrow Q$$

$$\text{強い力} \leftrightarrow \text{color}$$

に対して、

$$\text{重力} \leftrightarrow T_{\mu\nu}$$

と比較する方が正確です。

つまり光子のような静止質量ゼロの粒子もエネルギー・運動量を持つため重力と相互作用します。

14. 粒子と反粒子を統一して見る

フェルミオン場について、

$$\hat{\psi} = \underbrace{b u e^{-ipx}}_{\text{粒子を消滅}} + \underbrace{d^\dagger v e^{ipx}}_{\text{反粒子を生成}}$$

という一つの式が、

$$\text{粒子} + \text{反粒子}$$

を同時に含んでいます。

これを表にすると、

場	粒子	反粒子
電子場 ψ_e	e^-	e^+
u クォーク場	u	$\bar{u}$
d クォーク場	d	$\bar{d}$
ニュートリノ場	ν	$\bar{\nu}$ (Diracの場合)
陽子 (複合状態)	uud	$\bar{u}\bar{u}\bar{d}$
中性子 (複合状態)	udd	$\bar{u}\bar{d}\bar{d}$
π 中間子	$q\bar{q}$	荷電 π では $\pi^+ \leftrightarrow \pi^-$

場	粒子	反粒子
重力場 $h_{\mu\nu}$	graviton	自分自身が反粒子

15. 全体の比較表

粒子	構造	Spin	電荷 Q/e	色荷	重力源との関
電子 e^-	基本粒子	1/2	-1	無	$T_{\mu\nu}$
陽電子 e^+	基本粒子	1/2	+1	無	$T_{\mu\nu}$
u	基本粒子	1/2	+2/3	3	$T_{\mu\nu}$
$\bar{u}$	基本粒子	1/2	-2/3	$\bar{3}$	$T_{\mu\nu}$
d	基本粒子	1/2	-1/3	3	$T_{\mu\nu}$
$\bar{d}$	基本粒子	1/2	+1/3	$\bar{3}$	$T_{\mu\nu}$
ニュートリノ ν	基本粒子	1/2	0	無	$T_{\mu\nu}$
反ニュートリノ $\bar{\nu}$	基本粒子*	1/2	0	無	$T_{\mu\nu}$
陽子 p	uud	1/2	+1	singlet	$T_{\mu\nu}$
反陽子 $\bar{p}$	$\bar{u}\bar{u}\bar{d}$	1/2	-1	singlet	$T_{\mu\nu}$
中性子 n	udd	1/2	0	singlet	$T_{\mu\nu}$
反中性子 $\bar{n}$	$\bar{u}\bar{d}\bar{d}$	1/2	0	singlet	$T_{\mu\nu}$
π 中間子	$q\bar{q}$	0	+1, 0, -1	singlet	$T_{\mu\nu}$
重力子 g	重力場の量子	2	0	無	重力場自身も ルギーを持つ

* Majoranaニュートリノなら「ニュートリノと反ニュートリノが同一」という可能性があります。

16. 前回と今回を統合すると

ここまでで「波と粒子」の関係を、かなり統一的な形で書けます。

場	→	波動方程式	→	量子化
A_μ	→	$\square A_\mu = 0$	→	γ
ψ_e	→	$(i\gamma^\mu D_\mu - m_e)\psi_e = 0$	→	e^-, e^+
ψ_q	→	$(i\gamma^\mu D_\mu - m_q)\psi_q = 0$	→	$q, \bar{q}$
ν	→	Dirac/Majorana equation	→	$\nu, \bar{\nu}$
$h_{\mu\nu}$	→	$\square h_{\mu\nu} = 0$	→	graviton

ここから非常に重要な結論が得られます。

「波」と「粒子」は別々の物ではない

というより、場の量子論では、

量子場 $\left\{ \begin{array}{l} \text{波としての性質} \\ \text{粒子的な量子励起} \end{array} \right.$

という一つの数学的対象の二つの側面として理解できます。

そしてもう一段進めると、この全体をラグランジアン密度から統一できます。すなわち、電子・クォーク・ニュートリノについて

$\mathcal{L} \rightarrow \text{Euler-Lagrange 方程式} \rightarrow \text{Dirac 方程式} \rightarrow \text{正準量子化} \rightarrow b^\dagger, d^\dagger \rightarrow \text{粒子} \cdot \text{反粒子}$

を実際に一行ずつ導出し、さらに光子・グルーオン・重力子のボソン場との違いまで比較すると、「波・場・量子・粒子・反粒子」の関係を一つの数学体系としてまとめられます。

最後の質問です。今後、「量子」を「点」としてではなく、その「標準理論」を超えて、「紐」としてとらえる「超弦理論」と「量子重力理論」が発展しています。「標準理論」ではつかられていない、将来の重要になってくる「数学」についてアドバイスをお願いします。

はい、英治さん。今回の一連の「波 → 場 → 量子 → 粒子」という議論の先には、まさに**「点粒子を基本とする標準模型を越えた物理を、どの数学で記述するのか」**という問題があります。

ただし一点だけ整理すると、超弦理論は量子重力の有力な候補の一つであり、量子重力にはループ量子重力、漸近的安全性、因果的力学的三角形分割など別の研究方向もあります。また、以下の数学の多くは標準模型でも部分的には使われます。違いは、標準模型では中心的でなかった数学が、量子重力では**中心的な構造になる可能性**があることです。

1. 出発点：標準模型の数学

標準模型は非常に大まかには

$$\boxed{\text{時空} + \text{Lie群} + \text{表現} + \text{ファイバー束} + \text{量子場}}$$

で整理できます。

ゲージ群は

$$\boxed{G_{\text{SM}} = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y}$$

です。

時空 M の各点

$$x \in M$$

に量子場

$$\phi(x), \quad \psi(x), \quad A_\mu(x)$$

を置きます。

したがって標準模型の基本的発想は

$$\boxed{x \in M \longrightarrow \text{field } \Phi(x)}$$

です。

ところが量子重力では、この「背景として最初から時空の点 x が存在する」という考え方自体を問い直す研究があります。

2. 点から弦へ：超弦理論

点粒子なら世界線

$$X^\mu(\tau)$$

を考えます。

弦になると1次元的な物体なので、その運動は2次元の**世界面** **worldsheet**

$$\boxed{X^\mu(\sigma, \tau)}$$

を描きます。

したがって

point $\rightarrow$ worldline

から

string $\rightarrow$ worldsheet

へ数学が拡張されます。

Polyakov作用なら、

$$S = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu$$

です。

ここから既に、標準模型以上に重要になる数学が見えてきます。

2次元共形場理論 + 複素解析 + Riemann面 + トポロジー

です。

3. 今後特に重要だと考えられる数学①

微分幾何 $\rightarrow$ 複素幾何・Kähler幾何・Calabi-Yau幾何

超弦理論では10次元時空を考えるので、例えば

$$M^{3,1} \times X_6$$

のように、

$$4 + 6 = 10$$

として余分な6次元をコンパクト化します。

代表例がCalabi-Yau 3-foldです。

$$X_6 = \text{Calabi-Yau manifold}$$

これは単なるRiemann多様体より豊かな構造を持ち、

$$\text{Riemannian} \supset \text{Kähler} \supset \text{Calabi-Yau}$$

という方向で考えることができます。

代表的条件の一つはRicci-flatness、

$$R_{i\bar{j}} = 0$$

です。

したがって今後の数学として、

$$\text{複素多様体} \rightarrow \text{Kähler幾何} \rightarrow \text{Calabi-Yau幾何}$$

は非常に重要です。

4. 代数幾何学

ここは英治さんがこれまで勉強されてきた微分幾何から、さらに進む場合に特に重要です。

例えば多項式

$$f_1(z_1, \dots, z_n) = 0, \quad \dots, \quad f_k(z_1, \dots, z_n) = 0$$

の解集合

$$X = \{z \in \mathbb{C}^n \mid f_1(z) = \dots = f_k(z) = 0\}$$

を幾何学的対象として扱います。

弦理論では、

代数多様体, モジュライ空間, 層 sheaf, コホモロジー

などが重要になります。

特に「可能な幾何学そのものの空間」であるモジュライ空間

$$\mathcal{M}$$

という考え方は、通常の標準模型を学ぶだけでは見えにくい、非常に重要な概念です。

5. トポロジー → ホモロジー・コホモロジー

局所的な微分だけでなく、

$$\text{空間全体の大域的構造}$$

が重要になります。

典型的には

$$H_n(X), \quad H^n(X)$$

というホモロジー・コホモロジーです。

さらに微分形式を使えば、

$$d\omega = 0, \quad \omega \neq d\eta$$

という閉形式を用いて

$$H_{\text{dR}}^p(M) = \frac{\ker(d : \Omega^p \rightarrow \Omega^{p+1})}{\text{im}(d : \Omega^{p-1} \rightarrow \Omega^p)}$$

というde Rhamコホモロジーを作ります。

これはゲージ場、磁束、弦、D-braneなどを理解する際の自然な数学になります。

6. さらに重要：ホモトピー論

ホモロジーよりさらに「変形そのもの」を見るのがホモトピーです。

例えば

$$\pi_n(X)$$

というホモトピー群です。

量子重力では、

$$\text{点} \rightarrow \text{線} \rightarrow \text{面} \rightarrow \text{高次元対象}$$

を統一的に扱う必要が生じます。

ここから、

$$\text{homotopy theory} \rightarrow \text{higher homotopy theory}$$

が重要になってきます。

7. 圏論 → 高次圏論

これは、これまで英治さんと議論してきた圏論の自然な発展です。

通常の圏では、

$$X \xrightarrow{f} Y$$

という対象と射を考えます。

しかし弦や膜を考えると、

$$\text{点} \xrightarrow{\text{1-morphism}} \text{点}$$

だけでなく、射と射の変換

$$f \xrightarrow{\alpha} g$$

を考えることが自然になります。

さらに、

$$\text{objects} \rightarrow \text{morphisms} \rightarrow \text{2-morphisms} \rightarrow \text{3-morphisms} \rightarrow \dots$$

と進みます。

これが

$$n\text{-category}, \quad \infty\text{-category}$$

です。

「点粒子から弦・膜へ」という物理的拡張と、

$$\text{集合} \rightarrow \text{圏} \rightarrow \text{高次圏}$$

という数学的拡張には、非常に興味深い対応があります。

8. 表現論 → 無限次元表現論

標準模型では

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

の有限次元Lie群表現が非常に重要でした。

例えば

$$q_L \in (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}$$

というように粒子を分類します。

ところが弦理論では2次元共形場理論が登場するため、

Virasoro algebra

が重要になります。

その交換関係は

$$[L_m, L_n] = (m - n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0}$$

です。

したがって、

Lie群の表現論

からさらに、

無限次元Lie代数 + Virasoro代数 + Kac-Moody代数

へ進むことが有効です。

9. 非可換幾何学

通常の空間では座標は

$$xy = yx$$

と可換です。

ところが量子的な空間そのものを考えると、

$$[\hat{x}^\mu, \hat{x}^\nu] \neq 0$$

という可能性を考えられます。

これは、

点の集合としての空間

よりも

演算子の代数としての空間

を基本にしようという発想です。

つまり

$$\text{Geometry} \longrightarrow \text{Algebra}$$

という逆転が起こります。

これは量子時空を考える一つの数学的方向です。

10. ループ量子重力では別の数学が前面に出る

量子重力 = 弦理論だけではありません。

ループ量子重力では、

$$SU(2)$$

の表現を辺に割り当てたspin network

$$\Gamma = (V, E, j_e, \iota_v)$$

が重要になります。

模式的には、

$$\text{辺 } e \longrightarrow j_e = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

と $SU(2)$ の表現を割り当てます。

すると幾何そのもの、

面積, 体積

が量子化されます。

したがって、

$$\boxed{\text{Lie群} + \text{表現論} + \text{グラフ理論} + \text{組合せ論} + \text{位相幾何}}$$

という別の方向が重要になります。

11. ホログラフィーでは「情報」の数学が重要になる

量子重力のもう一つの大きな流れが

$$\boxed{\text{holography}}$$

です。

代表的な考え方がAdS/CFTで、模式的には

$$Z_{\text{gravity}} \sim Z_{\text{CFT}}$$

という、重力理論と量子場理論の対応を考えます。

ここでは、

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

という量子エンタングルメント・エントロピーが重要になります。

そのため、

$$\boxed{\text{量子情報理論} + \text{作用素環} + \text{テンソルネットワーク}}$$

が、量子重力の数学として以前より重要になっています。

「時空そのものが量子エンタングルメントから創発するのではないか」という研究方向と深く関係します。

12. ツイスター理論

これまで取り組まれてきたツイスターも、この流れに非常によく位置づけられます。

通常の時空点

$$x^\mu$$

を基本とするのではなく、スピノール

$$\omega^A, \quad \pi_{A'}$$

をまとめた

$$Z^\alpha = (\omega^A, \pi_{A'})$$

というtwistorを基本変数として使います。

incidence relation

$$\omega^A = ix^{AA'} \pi_{A'}$$

によってMinkowski時空とtwistor空間を結びます。

ここでも、

「時空点が最も基本である」という考えを変更する

という思想が現れます。

必要になる数学は、

複素幾何 + 射影幾何 + スピノール + コホモロジー + 代数幾何

です。

13. 今後学ぶ数学を整理すると


数学	標準模型	超弦・量子重力での役割
線形代数	◎	◎
Lie群・Lie代数	◎ 中心的	◎
表現論	◎	◎ → 無限次元へ
微分幾何	○	◎
Riemann幾何	GRで◎	◎
ファイバー束	◎ ゲージ理論	◎
複素解析	○	◎
複素幾何	限定的	◎
Kähler幾何	限定的	◎
Calabi-Yau幾何	基本的には不要	◎ 弦理論
代数幾何	限定的	◎
ホモロジー	補助的	◎
コホモロジー	使用される	◎
ホモトピー論	限定的	◎

数学	標準模型	超弦・量子重力での役割
圏論	基礎言語として利用可能	◎発展的
高次圏・ ∞ -圏	通常不要	重要な研究言語
非可換幾何	通常不要	量子時空の候補
グラフ・組合せ論	限定的	LQG等で重要
共形場理論	一部	◎弦・ホログラフィー
量子情報理論	標準模型の基礎には不要	量子重力で重要性増大
テンソルネットワーク	基本的には不要	ホログラフィー等
ツイスター幾何	不要	散乱振幅・重力等で重要

「標準模型で使われない」は厳密には言い過ぎになるものもあるので、ここでは標準模型の基本構築には必須でないが、その先で重要度が大きく増すという意味です。

14. 学習する順番

これまで学んできた内容との連続性を考えると、私は次の数学的な道筋が最も自然だと思います。



特に最後の

Quantum Geometry

を大きな目標として置くと、これまで学んできた数学が一本につながります。

15. 「点 → 弦」のさらに先

さらに興味深いのは、将来の量子重力では「弦」さえ最終的な基本対象ではない可能性があることです。

概念的には、

点 → 粒子 → 場 → 弦 → 膜・brane → 量子幾何

と進んでいます。

数学側でも、

集合 → 位相空間 → 多様体 → ファイバー束 → 圏 → 高次圏 → derived / quantum !

という拡張があります。

この二つを重ねると、

物理		数学
粒子	↔	点・表現
場	↔	束・切断
ゲージ力	↔	接続・曲率
弦	↔	Riemann面・CFT
D-brane	↔	代数幾何・圏
量子時空	↔	非可換・量子幾何
創発時空	↔	量子情報・エンタングルメント

という非常に美しい対応が見えてきます。

ですから、今後一つだけ数学の方向を選ぶなら、単一の新分野を選ぶというより、「幾何学を一般化していく」方向を軸にするのがよいでしょう。

微分幾何 → ファイバー束 → 複素・Kähler幾何 → 代数幾何 → トポロジー・コホモロジー

これは、これまでの「数学と物理学の関連」という探究を、**「数学的構造そのものから時空・粒子・相互作用がどのように生まれるのか」**という、量子重力の中心的な問いへつなげる自然な道筋だと思います。

今日は、ここまでしておきます。ありがとうございました。英治

こちらこそ、ありがとうございました、英治さん。

今回は、

波 → 場 → 量子化 → 粒子

から始めて、さらに

点粒子 → 弦・brane → 量子幾何・量子時空

までつなげることができました。特に、標準模型の Lie群・表現論・ファイバー束から、量子重力に向けた 複素幾何・代数幾何・コホモロジー・高次圏・量子幾何への流れは、今後の理解のよい骨格になります。

次回続けるときは、この全体像のどこからでも、具体的な数式を使って一段ずつ掘り下げられます。